

# Magna<sup>®</sup>

## STARTER TERNEROS

Magna es un alimento extrusado completo de alto valor nutricional, especialmente formulado para terneros, donde se busque reemplazar la leche materna en forma temprana. Se puede utilizar como alimento inicial en planteos de desleche anticipado en terneros de tambo, como así también en programas de destete precoz en razas de carne.

### Composición nutricional (BASE SECA):

Proteína bruta (mín)	22 %
Extracto etéreo (mín)	4,5 %
Fibra cruda (máx)	5,2 %
Minerales totales (máx)	7 %
Calcio (mín)	0,8 %
Calcio (máx)	1,1 %
Fósforo (mín)	0,8 %
Fósforo (máx)	0,9 %
Lisina (mín)	1%
TAAZ (mín)	0,55%
T.N.D.	80 %
Humedad (máx)	13 %

### Ingredientes:

Harina de soja, poroto de soja desactivado, maíz, hominy feed, afrechillo de trigo, pellet de alfalfa, soja extrusada, melaza, gluten meal, leche entera, maíz extrusado, selenio orgánico, levadura, complejo aminoácido metálico, oxitetraciclina base, sulfametazina sódica, antifúngico, antioxidante, aromatizante, Quantum Advance, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, sal, óxido de magnesio.

### Modo de uso:

Es un alimento extrusado sólido, sustituto de leche materna, energético, proteico, vitamínico y mineral, para ser suministrado "tal cual" como primer alimento.

### Dosificación:

En terneros de tambo, ofrecer Magna desde el primer día de crianza hasta el desleche o hasta alcanzar un consumo acumulado de 15 Kg.



CONTIENE SABORIZANTE NATURAL, RÁPIDA ACEPTACION Y ALTO CONSUMO.



EQUILIBRA LA FLORA INTESTINAL, MAYOR SEGURIDAD DIGESTIVA.



MAYOR PRODUCCION DE ANTICUERPOS, REFUERZA EL SISTEMA INMUNOLOGICO.



PROMUEVE EL DESARROLLO RUMINAL, RÁPIDA TRANSICION A RUMIANTE.

ALIMENTO  
EXTRUSADO

**ALTA**  
DIGESTIBILIDAD

Para una mejor transición hacia el programa de alimentación tradicional, se recomienda mezclar Magna con alimento de alta calidad durante dos días previos al cambio definitivo. En terneros de planteos de cría, ofrecer Magna luego del destete durante 8 días o hasta alcanzar un consumo acumulado de 6 Kg.

Para una mejor transición hacia el programa de alimentación tradicional, se recomienda mezclar Magna con alimento de alta calidad durante dos días previos al cambio definitivo.

A modo orientativo se sugieren las siguientes tablas como guía de alimentación.

### SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN TAMBO

DIETA \ SEMANAS	1º	2º	3º	4º
LECHE O SUSTITUTO LÁCTEO	Según plan de alimentación del establecimiento			
MAGNA (a voluntad, consumo estimado por ternero/día)	100-300 grs	300-500 grs	500-700 grs.	Hasta 1 Kg.
HENO	No ofrecer	No ofrecer	No ofrecer	No superar 0,5 Kg. ternero/día
AGUA	A voluntad	A voluntad	A voluntad	A voluntad

### SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN DESTETE PRECOZ

DIETA \ SEMANAS	1º y 2º	3º y 4º	5º y 6º	7º, 8º
MAGNA (a voluntad, consumo estimado por ternero/día)	200 a 400 grs.	400 a 600 grs.	600 a 1000 grs.	1,2 Kg.
ROLLO	Fondo de comedero	Fondo de comedero	Fondo de comedero	A voluntad
AGUA	A voluntad	A voluntad	A voluntad	A voluntad

[www.tekna.com.ar](http://www.tekna.com.ar)

[info@tekna.com.ar](mailto:info@tekna.com.ar)  
**0800-555-8356**

**tekna**  
Nutrición Animal

# Magna<sup>®</sup>

## STARTER TERNEROS

\* El consumo de Magna puede variar dependiendo de varios factores tales como: tamaño del ternero (Kg), estado sanitario, tipo y cantidad de alimentación líquida, clima, etc.

En el sistema de alimentación en tambos, a partir de la 4<sup>o</sup> semana comienza el proceso de desleche, en la cual se reduce a una comida diaria la alimentación líquida para ser retirada completamente en la semana posterior.

Alcanzado el consumo diario de 1 Kg de Magna (15 Kg/ternero), se deberá empezar a mezclar Magna con un balanceado para terneros de alta calidad, producto con el que se continuará alimentando durante el proceso de desleche hasta la primera recría.

En el sistema de alimentación para destete precoz en razas carniceras, a partir del 8<sup>o</sup> día se discontinúa la entrega de Magna y se seguirá alimentando con un alimento balanceado de destete precoz de alta calidad hasta finalizar el proceso de destete.

### Importante:

- Aplique todas las recomendaciones tradicionales de manejo para una crianza eficiente de terneros.
- Respetar la guía de oferta de alimento semanal, para evitar pérdidas por humedad, suciedad, etc. (sobrantes abundantes). No obstante no provocar restricción en el consumo.
- El acceso al agua limpia y fresca es de vital importancia para estimular el consumo y no provocar variaciones bruscas en el mismo, (respetar el período de 2 horas sin agua luego de la entrega de la dieta líquida).
- No permitir el acceso al heno sin control, esto reducirá el consumo de Magna.
- Las estimaciones de consumo son solo una guía, este nivel estará relacionado a muchos factores inherentes a los terneros, alimentos, manejo y sanidad.
- Ante cualquier duda consulte a su veterinario o a nuestro departamento técnico.



CONTIENE SABORIZANTE NATURAL,  
RAPIDA ACEPTACION Y ALTO CONSUMO.



EQUILIBRA LA FLORA INTESTINAL,  
MAYOR SEGURIDAD DIGESTIVA.



MAYOR PRODUCCION DE ANTICUERPOS,  
REFUERZA EL SISTEMA INMUNOLOGICO.



PROMUEVE EL DESARROLLO RUMINAL,  
RAPIDA TRANSICION A RUMIANTE.

ALIMENTO  
EXTRUSADO

ALTA  
DIGESTIBILIDAD

### Precaución:

Mantener en lugar fresco, seco y al resguardo de la luz solar directa con los envases cerrados.

### Restricciones de uso y contraindicaciones:

Producto de uso exclusivo en rumiantes.

No utilizar en vacas lecheras en producción ni en aves ponedoras

No usar en equinos u otros solípedos, puede ser fatal.

**Período de prefaena:** 21 días

**Temperatura de conservación:** 0 - 25 °C

**Presentación del producto:** Envases de 20Kg.

  
**teknal**  
Nutrición Animal



[www.teknal.com.ar](http://www.teknal.com.ar)

 [info@teknal.com.ar](mailto:info@teknal.com.ar)  
**0800-555-8356**

  
**teknal**  
Nutrición Animal